Puissant contre les graminées avec en PLUS un effet sur dicotylédones

hussar® DUO

ONEPASS

Un produit – un passage.
Désherbage simple et profitable.

- Produit avec 2 matières actives différentes garantissant une haute sécurité d'efficacité contre agrostides, vulpins, raygras, folles avoines, paturins et millets
- Efficace aussi contre de nombreuses adventices dicotylédones, gaillets et rumex inclus
- Utilisable sur blés d'automne et de printemps, seigles, triticales et orges de printemps
- Longue période d'utilisation en post-levée au printemps (jusqu'au stade 2 nœuds)
- Idéal comme stratégie anti-résistance
- Bonne sélectivité grâce au «safener» (antidote) incorporé

Bayer CropScience

Hussar® DUO contient Fenaxoprop-P-Ethyle et Iodosulfuron. Observer les risques de danger et les mesures de sécurité sur les emballages.

Bayer (Schweiz) AG
CropScience
3052 Zollikofen
Tél. 031 869 16 66
www.bayercropscience.ch

Raygras

Vulpins

Agrostides

Folles avoines

Mode d'action d'Hussar® DUO

Hussar® DUO est un herbicide combiné à effet principalement foliaire avec les matières actives Iodosulfuron (sulfonyl-urée) et Fenoxaprop-P-éthyle (acide phenoxypropionique). Hussar® DUO s'utilise au printemps contre les graminées et dicotylédones adventices dans les cultures de blés, seigles, triticales et orges de printemps. Les deux matières actives systémiques avec mode d'action différent garantissent un haut niveau d'efficacité contre les graminées telles que agrostides, vulpins, raygras, folles avoines, paturins et millets. Le Iodosulfuron possède en plus un effet performant contre de nombreuses adventices dicotylédones, y compris gaillets et rumex. Hussar® DUO agit de manière idéale lors de températures supérieures à 8 °C et lors d'une humidité relative de l'air dépassant 60%.

Hussar® duo – Sécurité d'efficacité contre graminées



Mode d'emploi d'Hussar® DUO

Hussar® DUO s'utilise au printemps après le départ de la végétation sur blés, seigles, triticales et orges de printemps en cours de montaison. Ne pas traiter l'orge d'automne et l'avoine avec Hussar® DUO et éviter les mélanges avec d'autres herbicides (sauf Primus) ainsi qu'avec les régulateurs de croissance.

Dosages:

- 1,25 l/ha d'Hussar® DUO sur blés d'automne, seigles et triticales dès le départ de la végétation jusqu'au stade 2 nœuds.
- 1 l/ha d'Hussar® DUO sur blés et orges de printemps dès le stade 3 feuilles jusqu'à fin tallage/1er nœud.

Large spectre d'efficacité avec Hussar® DUO contre les mauvaises herbes dicotylédones annuelles



*effet de 100% en mélange avec 0,75–1 dl/ha Primus

Fenêtre d'application pour Hussar® DUO au printemps

	Orge d'automne	Blé d'automne	Triticale	Seigle	Epeautre	Blé de printemps	Orge de printemps	Avoine	Dosage/ha	00	05	10	11	12	13	21	25	29	30	31	32	37	39	49	51	61	PER	IP-Suisse
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		1–1,25 l							Hussar® DUO											✓	✓